


DURANTE LA SETTIMANA CHE PRECEDE L'INTERVENTO **EVITARE** DI ASSUMERE FARMACI CHE CONTENGONO ACIDO ACETILSALICILICO (**ASPIRINA**) E RIDURRE IL CONSUMO DI **ALCOOL E SIGARETTE**. IL MEDICO DEVE COMUNQUE ESSERE INFORMATO IN ANTICIPO DI QUALUNQUE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN CORSO E DI OGNI EVENTUALE REAZIONE ALLERGICA A FARMACI. E' CONSENTITO UN PASTO LEGGERO 3-4 ORE PRIMA DI ARRIVARE IN CLINICA.



DOPO L'INTERVENTO VIENE DI SOLITO APPLICATA UNA **FASCIATURA ELASTICA**, CHE HA IL COMPITO DI IMPEDIRE CHE DURANTE IL SONNO IL PAZIENTE POSSA INVOLONTARIAMENTE PROVOCARE LA FUORIUSCITA DI QUALCHE UNITÀ FOLLICOLARE E DI PROTEGGERE LA ZONA IN CORRISPONDENZA DELLA SUTUR A. QUESTA FASCIATURA VIENE RIMOSSA IL GIORNO SUCCESSIVO, DOPO AVER INUMIDITO L'ULTIMO STRATO DI GARZE ADERENTI AL TRAPIANTO CON DELLA SOLUZIONE FISIOLGICA.



A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO È POSSIBILE DETERGERE DELICATAMENTE LE EVENTUALI **PICCOLE CROSTE** CON SODIO CLORURO 0,9% E TAMPONARE CON GARZE STERILI. LE CROSTE SONO DESTINATE A **STACCARSI** SPONTANEAMENTE NEL GIRO DI **12-15** GIORNI. CON ESSE DI SOLITO CADE ANCHE LA PORZIONE PIÙ ESTERNA DEI CAPELLI TRAPIANTATI. QUESTI ULTIMI COMINCIANO A RICRESCERE NORMALMENTE DOPO **12-18** SETTIMANE.

IN CORRISPONDENZA DELLA REGIONE DELLA FRONTE È POSSIBILE CHE SI VERIFICHINO, DURANTE I TRE-QUATTRO GIORNI SUCCESSIVI AL TRAPIANTO, UN **EDEMA INDOLORE** CHE PUÒ SCENDERE PER GRAVITÀ SOTTOCUTE ED INTERESSARE LE PALPEBRE.



QUESTO FENOMENO SCOMPARE NEL GIRO DI 48-72 ORE E PUÒ ESSERE EVITATO SE IL PAZIENTE APPLICHERÀ UN **BENDAGGIO ELASTICO** SULLA FRONTE PER I TRE GIORNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO (DURANTE I QUALI POTRÀ USCIRE CON UN BERRETTO).



I PUNTI DI SUTURA

SARANNO RIMOSSI DOPO UNA DECINA DI GIORNI. NEL CASO VENGANO UTILIZZATE SUTURE RIASSORBIBILI, QUESTE SI STACCHERANNO SPONTANEAMENTE O DIETRO UNA LEGGERA TRAZIONE DOPO CIRCA 15 GIORNI.

IN CORRISPONDENZA DELLA **ZONA DONATRICE** È FREQUENTE CHE SI MANIFESTI UNA ALTERAZIONE DELLA SENSIBILITÀ, CHE REGREDISCE NEL GIRO DI ALCUNE SETTIMANE

I CAPELLI POSSONO ESSERE LAVATI DOPO 4 GIORNI DAL TRAPIANTO.



L'ATTIVITÀ SPORTIVA PUÒ ESSERE RIPRESA DOPO 5-6 GIORNI. NON BISOGNA COLPIRE DI TESTA IL PALLO E FARE SUB PER ALMENO UN MESE DOPO L'INTERVENTO.



BISOGNA EVITARE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE PER ALMENO TRE SETTIMANE DOPO IL TRAPIANTO.



ANTIBIOTICI...../di x.....giorni

ANALGESICI...../di xgiorni

ALTRE TERAPIE.....



Per ogni ulteriore informazione siete pregati di telefonare ad uno di questi numeri:

DR. EMILIO LAVEZZARI : 0041-79-4710331 // 0039-335-6129428 // 0041-91-9947851